

## インフルエンザワクチン接種に伴う副作用

ワクチンをお受けになる前に以下をご一読ください。  
不明な点がございましたら薬剤師、または担当医師へお尋ねください。

### 注射ワクチン

#### <ときどき>

##### (全身症状)

- ・ 発熱
- ・ 気分不快
- ・ 悪寒
- ・ 倦怠感
- ・ 頭痛
- ・ 発汗
- ・ 筋肉及び関節痛

##### (注射部位の症状)

- ・ 発赤
- ・ 腫れ
- ・ 軽い痛み
- ・ 出血斑
- ・ 皮膚が硬くなる

\* これらの症状は、通常 2～3 日で自然に消失します。

#### <まれに>

- ・ 全身のかゆみ、発疹

#### <ごくまれに>

- ・ 神経の痛み
- ・ 全身、または局所のしびれ
- ・ けいれん
- ・ 血小板減少:あざが出来やすい、出血しやすい等
- ・ アナフィラキシー:じんましんと以下の症状(口やのどの腫れ、ゼイゼイ音のする呼吸、ショック、下痢、腹痛)のうちどれかがある
- ・ 血管の炎症

\* 上記症状が出た場合は、速やかに当院にご連絡頂くか、お近くの救急外来にご相談下さい。